

WERKINSTRUCTIE

Afnemen urinekwiek uit urinstoma

Datum herziening

: 2028

Doel van de handeling

Het afnemen van een urinekweek bij een stomadrager met een urostoma.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Verpleegkundigen niveau 4, 5 en 6.

Benodigdheden

- zonodig een onderlegger
- bekkentje met natte en droge onsteriele gazen
- steriel urinekweek container
- schoon stoma materiaal

Werkwijze

Indien urine uit het stomazakje gehaald moet worden:

- Volg protocol (hand)hygiëne van het ziekenhuis/instelling/organisatie.
- Huid en stoma schoonmaken met onsteriele gaas.
- Nieuw stoma materiaal (huidplaat en zakje) aanbrengen.
- 10-20 ml opvangen uit het stomazakje en in de urinecontainer voor urinekweek.

Indien urine uit de stoma/ bricker lis gehaald moet worden:

- Reinig de opening van het stoma voorzichtig met lauwwarm water.
- Vang de urine op in de steriele container.

Aandachtspunten

- Bij een urostoma bevat de urine altijd bacteriën. Een urinekweek is dus altijd positief, maar hoeft niet altijd te wijzen op een infectie.

Verwijzingen

Richtlijn Stomazorg Nederland V&VN, Herziening november 2018